OCEANIC-AF : Asundexian versus Apixaban dans la fibrillation atriale

CRITÈRES DE JUGEMENT
Efficacité : AVC, embolie systémique / Sécurité : saignement majeur ISTH
Bénéfice net : AVC, embolie systémique, saignement majeur

CARACTÉRISTIQUES DES PARTICIPANTS

Femmes 35 %	Âge 74 ans	Diabète 37 %	HTA 89 %	CAD 33%	Ins. rénale 19 %	Ins. cardiaque 47 %	AVC 18 %	Anémie 18 %	CHA2DS2-VASc 4,3

Question 1 : L'Asundexian est-il supérieur à l'Apixaban chez les patients en FA ?

Question 2 : L'Asundexian améliore-t-il la survie ou réduit-il le risque de décès CV, infarctus ou AVC par rapport à l'Apixaban ?

	Asundexian	Apixaban	HR (IC 95 %)
Bénéfice clinique net	Différence +0,63 (0,14-1,12)		
Décès toutes causes	0,8 %	1,0 %	0,84 (0,60-1,19)
Décès CV, IDM, AVC	2,1 %	1,0 %	2,02 (1,54-2,66)
Saignement majeur ISTH	0,2 %	0,7 %	0,32 (0,18-0,55)
Saignement intra-crânien	<0,1 %	0,3 %	0,16 (0,05-0,55)
Saignement mineur	2,5 %	4,3 %	0,59 (0,49-0,70)

NON

CONCLUSION : les résultats de l'étude OCEANIC-AF sont une déception, l'étude ayant été arrêtée prématurément en raison d'un excès d'événements ischémiques avec l'inhibiteur du facteur XI. On observe néanmoins une réduction marquée des événements hémorragiques par rapport à l'Apixaban chez ces patients en FA. Les études en cours avec d'autres inhibiteurs du facteur XI ou dans d'autres situations cliniques apporteront une réponse sur le devenir de cette nouvelle classe médicamenteuse.

Piccini JPetal. Asundexian versus Apixaban in Patients with Atrial Fibrillation. DOI: 10.1056/NEJMoa2407105