


POPular pause TAVI : poursuite ou interruption des anticoagulants après TAVI




CRITÈRES DE JUGEMENT

Décès CV, AVC, IDM, complications vasculaires majeures, saignement majeur à 30 j

CARACTÉRISTIQUES DES PARTICIPANTS

Femmes 34,5 %	Âge 81 ans	Diabète 29 %	HTA 77 %	CAD 48 %	AOMI 19 %	AVC 11 %	FA 96 %	CHA2DS2-VASc 4,5

Question 1 : Poursuivre les anticoagulants est-il aussi sûr que les interrompre ?



OUI

Question 2 : Y a-t-il une différence sur les différents événements ?

	Poursuite	Interruption	Différence de risque(IC95 %)
Décès	2,1 %	2,1 %	0 (-1,9 à 1,9)
Décès CV	2,1 %	2,1 %	0 (-1,9 à 1,9)
AVC	3,2 %	4,4 %	-1,2 (-3,8 à 1,4)
Saignement majeur	11,1 %	8,9 %	2,2 (-1,8 à 6,3)

NON

CONCLUSION : il est traditionnellement recommandé d'interrompre les anticoagulants avant un TAVI. POPular Pause montre que la poursuite du traitement n'entraîne pas de problème majeur. Il y a un peu plus de saignements, un peu moins d'AVC et la mortalité à 30 jours est similaire. La borne de non-infériorité retenue par le protocole de l'étude était cependant assez lâche (différence de 4 % dans la survenue du critère principal).

Van Ginkel D. et al. Continuation versus Interruption of Oral Anticoagulation during TAVI. DOI: 10.1056/NEJMoa2407794