CLEAR : Spironolactone systématique après infarctus du myocarde

CARACTÉRISTIQUES DES PARTICIPANTS

Femmes 20 %	Âge 61 ans	Diabète 19 %	HTA 46 %	Fumeurs 41 %	STEMI 95 % Killip ≥ II 0.7 %	Statine 97 % , Aspirine 97 % Clopi 42 % , Tica 45 % , Prasu 11 % IEC / ARA2 78 %

Question 1 : La Spironolactone améliore-t-elle le pronostic après infarctus ?

Question 2 : Y a-t-il une différence sur les différents événements ?

	Spironolactone	Placebo	HR (IC 95 %)
Critère 1	1,7 pour 100 p-a	2,1 pour 100 p-a	0,91 (0,69-1,21)
Critère 2	7,9 pour 100 p-a	8,3 pour 100 p-a	0,96 (0,81-1,13)
Décès	4,7 %	5,0 %	0,95 (0,77-1,17)
Décès CV	3,2 %	3,3 %	0,98 (0,76-1,26)
Ins. Cardiaque	1,6 %	2,4 %	0,77 (0,51-1,16)
Récidive IDM	3,0 %	3,0 %	1,02 (0,77-1,35)
AVC	1,4 %	1,2 %	1,15 (0,72-1,84)

NON

CONCLUSION : la composante Spironolactone de CLEAR a testé l'hypothèse qu'un minéralocorticoïde administré systématiquement après un infarctus (essentiellement STEMI) revascularisé par angioplastie, quelle que soit la fonction ventriculaire gauche, pouvait améliorer le pronostic. Il n'y a pas de bénéfice clinique pour le traitement. Ces résultats s'opposent à ceux de RALES et EPHEBUS, qui avaient montré l'intérêt d'un minéralocorticoïde dans les suites d'un infarctus à FEVG altérée. Il n'y a malheureusement pas eu d'analyse de sous-groupe en fonction de la FEVG. En revanche, l'analyse régionale montre l'absence complète de bénéfice chez les patients inclus en Amérique et en Europe, dont le pronostic est meilleur avec un taux d'événements du critère 2 de 8 % seulement à 3 ans, que celui des autres régions du monde.

Jolly SS et al. Routine Spironolactone in Acute Myocardial Infarction. DOI: 10.1056/NEJMoa2405923